

a 18
EINIGE BEOBACHTUNGEN

ZUR

Lane Medical Library

ANATOMIE UND PATHOLOGIE DES LUPUS.

INAUGURAL - DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER MEDICINISCHEN DOCTORWÜRDE

AN DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

VON

HEINRICH STILLING.

LEIPZIG,

DRUCK VON J. B. HIRSCHFELD.

1877.

EINIGE BEOBACHTUNGEN
ZUR
ANATOMIE UND PATHOLOGIE DES LUPUS.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER MEDICINISCHEN DOCTORWÜRDE

AN DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

VON

HEINRICH STILLING.

LEIPZIG,
DRUCK VON J. B. HIRSCHFELD.
1877.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Nachdem die Meinungsverschiedenheiten der älteren Autoren über den anatomischen Sitz und den Ausgangspunkt des Lupus vorzüglich durch die Arbeiten von Virchow¹⁾ und Auspitz²⁾, welche mit der eingehenden Darstellung der in Rede stehenden Krankheit in R. Virchow's klassischer Geschwulstlehre ihren Abschluss fanden, fast gänzlich beseitigt waren, schien die Anschauung, dass der lupöse Process auf einem Granulationsvorgang im Bindegewebe beruhe, bei der Mehrzahl der Pathologen festen Fuss gefasst zu haben.

Nur Rindfleisch³⁾ stand durch seine vielbestrittene Auffassung des Lupus als Adenom der Hautdrüsen im Widerspruch mit dieser allgemein herrschenden Ansicht.

So schien denn die Lehre vom Lupus sowohl in klinischer wie anatomischer Beziehung fast einem vollkommenen Abschlusse nahe gekommen zu sein, als es Friedländer⁴⁾ gelang, durch die Entdeckung der Riesenzellen des Lupusgewebes und durch den Versuch den Lupus in die Reihe der tuberculösen Affectionen zu ziehen, von Neuem die Blicke der Forscher auf dieses Gebiet zu lenken.

In der That rief die Publication dieser in mannigfacher Hinsicht

1) Geschwülste II. 482 ff.

2) Wiener med. Jahrb. 1864. II.

3) Patholog. Gewebel. S. 292 ff.

4) Centralblatt 1873; Virchow's Archiv Bd. 60; Volkmann's Sammlung klin. Vortr. Nr. 64.

bemerkenswerthen Untersuchungen bald eine Reihe ¹⁾ von Arbeit hervor, welche theilweise die Angaben Friedländer's, vor Allem das häufige Vorkommen von Riesenzellen in dem erkrankten Gewebe, bestätigten, theilweise auch weitere Erfahrungen, namentlich über die Ursprungsstätten des Lupusgewebes zu berichten bestrebt waren.

Unter den mancherlei neuen Ansichten, welche in der einen oder der anderen dieser Untersuchungen begründet wurden, tauchte auch eine Behauptung auf, welche der seitherigen Lehre fremd geblieben war, die Behauptung, dass unter Lupus nicht eine anatomisch scharf charakterisirte Krankheit, sondern lediglich ein klinischer Begriff zu verstehen sei.²⁾

R. Volkmann ³⁾ hat bereits in einem ausgezeichneten Aufsatz auf das Unrichtige dieser Anschauung hingewiesen und zugleich die Vermuthung ausgesprochen, dass dieselbe auf Irrthümern in der klinischen Diagnose beruhen müsse. In der That wird man bei einer eingehenden Untersuchung unter den in einem längeren Zeitraum zur Beobachtung gekommenen Lupusfällen einzelne ganz verschiedenartige Neubildungen antreffen, welche in ihren klinischen Erscheinungen so manche Aehnlichkeit mit dem gewöhnlichen Lupus und zugleich so wenig sichere Anhaltspunkte für eine bestimmte Diagnose darboten, dass man versucht war diese Erkrankungen als Lupus zu bezeichnen, trotzdem man sich der klinischen Verschiedenheiten wohl bewusst gewesen.

Erst durch das Ergebniss einer genauen histologischen Untersuchung wird man solchen Fällen gegenüber in den Stand gesetzt sein, jene häufig nur unbedeutenden klinischen Differenzen zu verwerthen und diesen Erkrankungen ihre besondere Stellung in dem onkologischen Systeme zuzuweisen.

Für alle klinisch scharf charakterisirten Lupusfälle aber wird es nicht zu schwierig sein, stets entsprechende einheitliche anatomische Bilder von bestimmtem Gepräge aufzufinden, und ich möchte hier vollkommen der Ansicht von Rindfleisch beistimmen, welcher sich anheischig macht, den Lupus aus der mikroskopischen Analyse ebenso sicher zu diagnosticiren, als das Carcinom.

In den folgenden Blättern ist der Versuch gemacht worden

1) E. Lang, Wien. med. Jahrb. 1875; Pantlen, Ueber Tuberculose der Haut 1873; Essig, Arch. von Roser und Wunderlich 1874; Thoma, Virchow's Archiv Bd. 65. 1875.

2) Vergl. Essig l. c.

3) Ueber Lupus und Tuberculose. Berlin. klin. Wochenschr. 1875. Nr. 30.

einige interessante der obigen Reihe von Neubildungen angehörende Geschwulstformen etwas eingehender zu schildern; zugleich möge es gestattet sein mit wenigen Worten vorher die Bilder zu besprechen, welche man durch die Untersuchung klinisch wohl charakterisirter Lupusfälle zu erhalten Gelegenheit hat.

Die Bildungsstätte des Lupusgewebes ist von denjenigen Autozen, welche sich in der neuesten Zeit genauer mit dieser Erkrankung beschäftigt haben, in eine sehr nahe Beziehung zu den kleineren Blut- und Lymphgefässen der Haut gebracht worden (Lang, Thoma).

Die Wahrheit dieser Angaben ist durch eine sorgfältige Untersuchung geeigneter an der Grenze der erkrankten Partien geführter Durchschnitte nicht allzu schwer zu bestätigen, und man kann bald die Ueberzeugung gewinnen, dass die frühesten pathologischen Veränderungen an den Gefässen zu treffen sind.

Die grossen ovalen Kerne der Capillaren und die Zellen der Adventitia der kleineren Arterien und Venen zeigen sich meist in der Richtung der Längsaxe derselben nicht unbedeutend vermehrt. An den Seiten dieser Gefässe erblickt man häufig mehr oder minder dichte Ansammlungen junger lymphoider Elemente, von denen einzelne unter Umständen noch ihren einstigen durch einen feinen Fortsatz vermittelten Zusammenhang mit den Elementen der Gefässwand erkennen lassen. Diese Wucherungen vereinigen sich nun mit ähnlichen von den nächstliegenden Gefässchen ausgehenden Zellanhäufungen, indem sie aus den beschriebenen Rundzellen zusammengesetzte Fortsätze aussenden, und grenzen auf diese Weise in dem Bindegewebe einen Raum ab, der sich in kurzer Frist — wohl unter gleichzeitiger Proliferation der Bindegewebszellen — ganz mit Zellen erfüllt, und so einen kleinen aus jungen lymphoiden Elementen bestehenden Herd, einen primären Lupusherd, darstellt.

Die weitere Entwicklung dieser kleinsten Gebilde geht alsdann ziemlich rasch vor sich. In dem Inneren und gegen die Peripherie des Knötchens entziehen die wuchernden Zellen bald jeden noch erkennbaren Rest der ihren Ursprung verrathenden Gefässe den Blicken des Beobachters. Zugleich geht eine Zellproliferation vom Rande des Knötchens aus, das angrenzende Bindegewebe wird mit jungen lymphoiden Elementen infiltrirt und so mit in den Bereich des primären Herdes gezogen.

Diese also entstandenen Herde zeigen bald mehr längliche, polygonale, bald mehr rundliche Formen. Die ersteren sind seltener, grösser als die runden, sie gehen diffus in das benachbarte Gewebe

über; die letzteren, die anderen an Zahl bei weitem überwiegen sind relativ klein und scharf gegen die Umgebung abgegrenzt. In manchen Fällen wird die Grenzregion durch spindelförmig ausgezogene concentrisch gelagerte Zellen gebildet (E. Lang).

Je weiter wir nun gegen das Centrum der Erkrankung vorrücken, desto zahlreicher und dichter gedrängt finden wir die Knötchen, und während wir den primären Wucherungen bisher zu meist in den mittleren und tieferen Schichten der Cutis begegnet waren, treffen wir dieselben jetzt auch in der Nähe der Oberhaut an.

Häufig confluiren hier mehrere Knötchen zu einem schon makroskopisch sichtbaren grösseren Knoten, welcher die Epidermis emporhebt und nur noch durch eine schmale ganz mit jungen Zellen infiltrirte Cutisschicht von derselben getrennt ist.

Allmählich nehmen auch die histologischen Bestandtheile der primären Lupusherde einen anderen Charakter an. Zwischen den jungen Rundzellen treten zuerst vereinzelt, dann immer massenhaft jene aus der Anatomie des miliaren Tuberkels hinlänglich bekannten epitheloiden Zellen auf. Dieselben sind 2—5 mal so gross als die lymphoiden Elemente, sie besitzen ein fein granulirtes, leicht gelblich aussehendes Protoplasma, welches zwei oder mehr mit einer oder mehreren Kernkörperchen versehene ovale Kerne birgt. Auch diese Zellformen schliessen sich direct die schon mehrfach erwähnten rundlichen oder ovalen Riesenzellen an, welche in wechselnder Zahl in den Lupusherden beobachtet werden. Meist findet sich nur eine central gelegene Riesenzelle vor, nicht allzu selten enthält ein Herd auch eine grössere Anzahl dieser Gebilde. Das Protoplasma der Riesenzellen ist feinkörnig, von grauem oder bräunlichem Aussehen. Dasselbe enthält eine grosse Menge länglich-runder, unregelmässig angeordneter, meist in der Mitte der Zelle angehäufter, mit Kernkörperchen ausgestatteter Kerne. Dann und wann sind auch Vacuolen in dem Protoplasma zu beobachten.

Bevor wir nun die ferneren Schicksale der Lupusherde verfolgen, möge es uns erlaubt sein einen Blick auf diejenigen krankenhaften Affectionen zu werfen, welche die Einstülpungen der Epidermis, die Schweissdrüsen, die Haarbälge und Talgdrüsen unter dem Einfluss der im Vorhergehenden geschilderten Vorgänge erleiden.

Die fast constant vorkommenden und in genetischer Beziehung nicht unwichtigen Veränderungen der Schweissdrüsen sind von den meisten Autoren bisher keiner besonders eingehenden Betrachtung gewürdigt worden.

Die hier zur Beobachtung kommenden pathologischen Processe betreffen bald mehr die epitheliale Auskleidung des Drüsenkanals, bald mehr das interstitielle Bindegewebe. Wie leicht verständlich sind auch Combinationen beider Erkrankungsformen nicht eben selten zu beobachten.

Schon von den älteren Autoren — es möge hier nur beispielsweise Auspitz genannt sein — sind Wucherungsvorgänge, Hypertrophien der Schweissdrüsenepithelien notirt worden. Der später von Rindfleisch vertheidigten Anschauung, welche den in Rede stehenden Affectionen eine ungemeine Bedeutung für den Lupus beilegte, haben wir schon oben Erwähnung gethan. In der neuesten Zeit hat E. Lang ausführlicher über die Proliferation der Schweissdrüsenepithelien berichtet.

Dieselbe gestaltet sich nach den mir vorliegenden Untersuchungen in zweifacher Weise.

Einmal gehen von den einzelnen Abschnitten des Drüsenkanals sowohl wie von den Ausführungsgängen solide Zellsprossen aus, welche irgendwo in der Cutis oder, wie E. Lang hervorhebt, in den Lupusherden selbst mit einer kolbigen Anschwellung ihr Ende finden. Unter Umständen können diese Gänge auch ein Lumen erhalten und so als wirkliche Drüsenneubildungen imponiren.

Auf der anderen Seite bleibt die Wucherung der Epithelien auf den noch innerhalb der bindegewebigen Umbüllung liegenden Knäuel beschränkt. Die vergrößerten Zellen dringen hier in buckelförmigen Ausbuchtungen gegen das Lumen des Drüsenkanals vor und verstopfen dasselbe schliesslich vollständig.¹⁾ Solche Drüseneschläuche gewähren dann auf dem Durchschnitte das Bild einer Riesenzelle, zumal wenn — wie das häufig der Fall ist — ein Theil der neugebildeten Epithelien später zu einer feinkörnigen Masse zerfällt (s. Taf. Fig. 3).

Dieser Vorgang kommt im Allgemeinen doch nicht allzu selten in sonst relativ wenig afficirten Schweissdrüsen zur Beobachtung, und man ist daher öfters in der Lage, eine grössere Anzahl solcher scheinbarer Riesenzellen nebeneinander zu sehen. Aehnliche Beobachtungen müssen bereits Lang zu Gebote gestanden haben, da er die Epithelien der von der Lupuswucherung gegeneinander gepressten Schlauchabschnitte zu vielkernigen Massen werden lässt.

Ich sagte soeben „scheinbare Riesenzellen“. Die Berechtigung

1) Ob die von A. Förster (Handbuch II. S. 1086) erwähnten concentrischen Zellaggregate in den Gängen der Schweissdrüsen auf gleichen Verhältnissen beruhen, lasse ich dahingestellt.

dieses Beiwortes dürfte sich wohl aus der obigen Darstellung ob Weiteres ergeben, denn man kann in der That unmöglich Lar beistimmen, welcher alle diese Bilder mit den sonst im Lupus v kommenden Riesenzellen zu identificiren scheint. Es mag hier no zum Ueberflusse bemerkt werden, dass die Kerne dieser Pseu Riesenzellen¹⁾ ihrer Entstehung entsprechend meist ziemlich rege mässig am Rande der einzelnen Gebilde angeordnet sind, währen die Kerne der wahren Riesenzellen sich mehr im Centrum angehäu finden.

Die zweite der von uns erwähnten pathologischen Veränderu gen der Schweissdrüsen, die kleinzellige von dem interstitiell Bindegewebe ausgehende Infiltration kommt häufiger vor und ist au von den meisten Autoren gesehen worden. Von vornherein will ic den positiven Angaben mancher Untersucher gegenüber ganz beso ders hervorheben, dass diese im Lupus vorkommende Affection d Schweissdrüsen sehr wohl zu der Bildung eigentlicher Lupusknö chen führen kann.

Der Process beginnt in dem interstitiellen Bindegewebe a Rande einer Drüse und breitet sich von da allmählich auf die übri gen Abschnitte aus. Die wuchernden jungen Zellen überdecken d Epithelien des Drüsenknäuels, welche sich, wie es scheint, weni stens nicht immer direct an diesen Vorgängen betheiligen (s. Ta Fig. 2).

Nach und nach wird die ganze Drüse in einen Rundzellenhaufe umgewandelt, welcher meist noch innerhalb des umgebenden Bind gewebes gelegen ist und sich von einem primären Lupusknote durch nichts unterscheidet. Später gehen diese Herde ebenfalls jen oben für die primären Lupusherde beschriebenen Veränderungen ei Auch das Vorkommen von vielkernigen Massen, welches also a Complication der epithelialen mit den interstitiellen Wucherungsvö gängen schliessen lässt, habe ich einige Male beobachtet.

Von den Affectionen der Haarbälge und Talgdrüsen kann ic wenig berichten. Zwar sind auch in ihrer Umgebung öfters Wuch rungsvorgänge zu constatiren, aber ich habe niemals gesehen, das diese Gebilde sich irgendwie an dem Aufbau der Lupusknötche

1) Für diese Gebilde dürfte sich vielleicht die von Lang für alle Rieser zellen ohne Unterschied gebrauchte Bezeichnung „vielkernige Massen“ sehr en pfehlen, während für die eigentlichen Riesenzellen, deren zellige Natur doch wo unzweifelhaft ist, der alte Name besser beizubehalten wäre. Man vergleiche übrigens in Bezug auf das Letztere E. Ziegler's äusserst interessante Unter suchungen über die Herkunft der Tuberkelelemente.

theiligt hätten. Auch die von E. Lang hier beschriebenen netzartigen Massen habe ich bis jetzt nicht auffinden können.

Milien kamen dann und wann zur Beobachtung; die Haare waren im Bereich der Neubildung meist ausgefallen, die noch vorhandenen zeigten sich wenig verändert.

Wucherungen, welche von den Zellen der Oberhaut ausgehen, kommen selbst in bereits ulcerirten lupösen Hautpartien nicht eben selten vor. Diese Epithelproliferationen erreichen unter Umständen eine solche Mächtigkeit, dass sie, wie W. Busch zuerst für die Extremitäten nachwies¹⁾, im Stande sind, hin und wieder das Bild eines Carcinoms vorzutäuschen.

In einem von mir untersuchten Falle von epitheliomartigem Lupus des Gesichts durchzogen breite nach vielen Richtungen hin netzartig unter einander verbundene, aus grossen Zellen zusammengesetzte und viele Perlkugeln enthaltende Epithelstränge das kleinfellig infiltrirte Gewebe der Cutis. Die zwischen jene Epithelnetze eingelagerten vollkommen typisch gebauten und zahlreiche Riesenzellen bergenden Knötchen verliehen diesen Bildern ein ganz eigenenthümliches und äusserst charakteristisches Gepräge.

Wenden wir nun nach dieser kurzen Abschweifung unsere Aufmerksamkeit wieder der Betrachtung derjenigen Vorgänge zu, welche sich an den im Eingange geschilderten Lupusherden und ihrer Umgebung im weiteren Verlaufe des Processes abspielen.

Wir hatten dieselben oben gerade in dem Zeitpunkte verlassen, welchem sie in ein secundäres, durch das Auftreten der epithelioiden und Riesenzellen charakterisirtes Stadium eingetreten waren. Mit dieser Umwandlung der Lupusherde macht sich nun zugleich eine immer mehr zunehmende Infiltration der bis dahin relativ wenig infiltrirten übrigen Cutis bemerklich. Die Papillen erscheinen dicht mit jungen Zellen angefüllt, und die Contouren der bisher ziemlich scharf umgrenzten Lupusknötchen fangen an sich in der allgemeinen Infiltration zu verwischen. Nicht unerwähnt bleiben darf ferner, dass ein Theil der Herde sich durch Zerfall seiner zelligen Elemente in eine undeutlich feinkörnige käsige Masse umwandelt. Die Zellen des Rete werden durch die immer mächtiger werdende Wucherung der jungen Rundzellen allmählich zum grössten Theil verdrängt, und bald stellt sich statt der herdweise erkrankten Cutis nur noch eine grosse Fläche unseren Blicken dar, in welcher Riesenzellen,

1) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. I. S. 120 ff.

epitheloide Zellen, lymphoide Elemente und zerfallenen Massen ohne jede Ordnung durcheinander liegen.

Während nun diese Vorgänge in dem anfänglich vom Lupus befallenen Gebiete Platz greifen, treten in der benachbarten Cutis in dem subcutanen Fettgewebe und in den Muskeln ebenfalls die charakteristischen Lupusherde auf. Auch hier stehen dieselben, wie man leicht constatiren kann, mit den Gefässen in engem Zusammenhange. Von einer kleinen Arterie oder Vene ausgehend, ziehen die wuchernden lymphoiden Elemente zwischen die Interstitien der Fettzellen, um dieselben zuerst kranzförmig zu umringen und dann bald ganz den Blicken zu entziehen (Rindfleisch l. c.). Mitunter sieht man auch, wie diese Rundzellen von allen Seiten her eine grosse Fettzelle zusammendrücken und so derselben oft wundersame Formen verleihen, die sich später inmitten der Lupusherde wiederfinden.

Die Herde selbst sind meist von rundlicher Gestalt und zeigen oft nicht unbedeutende Dimensionen.

Nach der übereinstimmenden Ansicht der Autoren schreitet nur der Process auch auf die tiefer gelegenen Gewebe längs der Blutgefässe fort, er ergreift die Muskeln und kann, allerdings in selteneren Fällen, auch Knorpel und Knochen zerstören.

Nach den wenigen Präparaten, welche mir über Muskellupus vorliegen, scheint es als ob die Substanz der Muskelfasern selbst — wenigstens im Anfang — keine besonderen Alterationen erlitte. Dieselben zeigen sich vielmehr durch die zwischen sie eingelagerten grossen rundlichen Knoten blos verdrängt und lassen höchstens einmal eine Vermehrung der Kerne des Sarcolemms erkennen. Die Knoten zeigen auffallend grosse und zahlreiche Riesenzellen (s. Taf. Fig. 5).

Von Lupus des Knorpels und Knochens standen mir keine Präparate zu Gebote.

Das Ende des Processes ist leicht verständlich.

Jene in den vorigen Blättern beschriebene, aus epitheloiden Riesenzellen und jungen Rundzellen bestehende Infiltration der Cutis macht allmählich einem Granulationsgewebe Platz, welches die etwa noch vorhandenen Reste der Epidermis zerstört und so, von zahlreichen grossen Capillaren durchzogen, bald offen zu Tage liegt. Hier und da finden sich in demselben noch einige Riesenzellen oder einige jener soeben erwähnten Fettklumpen eingelagert, als die einzige Andeutung der früher vorhandenen Lupusherde. Spät erst bildet sich an einer gewöhnlich in ihrer Lage nicht näher zu bestimmenden Stelle eine derbe bindegewebige Narbe, welche, wie der klinische

erlauf ja zur Genüge lehrt, nur langsam fortschreitet und zu häufig erst nach langer Zeit noch einem Recidive zum Opfer fällt.

Schliesslich will ich nicht unerwähnt lassen, dass man öfters Gelegenheit hat in lupös erkrankten Theilen jene in der neueren Zeit wiederholt beschriebene Arterienaffection — Arteriitis obliterans (Friedländer) — anzutreffen, und es erscheint in der That nicht unstatthaft, auf diesen Vorgang die Verödung der in den primären Lupusherden beobachteten Gefässe zurückzuführen¹⁾ (s. Taf. Fig. 4).

Wenden wir nun den Blick auf das Gebiet derjenigen Affectionen, welche in Folge unvollkommener klinischer Beobachtungen mehrfach mit dem Lupus zusammengeworfen sind, und dadurch einige neuere Untersucher zu der Aufstellung des im Eingange erwähnten Satzes, unter der Bezeichnung „Lupus“ sei lediglich ein klinischer Begriff zu verstehen, verleitet haben.

In erster Linie wäre wohl hier die Syphilis zu nennen, von der man ja von jeher zugegeben hat, dass sie dem Lupus ausserordentlich ähnliche Hautaffectionen zu erzeugen im Stande ist (vgl. Virchow, Geschwülste II, 493).

Wir können folgende hierher gehörige Beobachtung berichten.

In dem vergangenen Semester stellte sich auf der hiesigen chirurgischen Klinik ein Patient mit einer Erkrankung der Nase vor, welche bei oberflächlicher Betrachtung fast vollkommen mit dem gewöhnlichen Knotenlupus übereinstimmte. Die Affection war auf die Nase beschränkt und die übrige Gesichtshaut zeigte nirgends verdächtige Eruptionen. Das Einzige von der gewöhnlichen Beschaffenheit der Lupusknoten Abweichende war die nicht unbedeutliche Grösse und die an manchen Stellen mehr länglich gebundene Gestalt der Prominenzen. Die in Rücksicht hierauf von Herrn Prof. König ausgesprochene Vermuthung, es möge sich in diesem Falle nicht um Lupus, sondern möglicherweise um eine syphilitische Affection handeln, führte zu einer genaueren Unter-

1) Die in den obigen Blättern gegebene Darstellung schliesst sich im Allgemeinen ganz der vortrefflichen Arbeit von E. Lang an und weicht in erheblicher Weise fast nur in der Behandlung der pathologischen Veränderungen der Schweissdrüsen von derselben ab. Die von mir untersuchten, von Herrn Prof. König excidirten Hautstücke (im Ganzen 12 an der Zahl) stammten meist von dem gewöhnlichen Lupus nodosus. Ausserdem wurden auch vielfach mit dem scharfen Löffel entfernte Gewebspartien zu Rathe gezogen. Die Methode der Untersuchung bot nichts von den gewöhnlich angewandten Abweichendes dar.

suchung des Patienten. In der That stellte sich auch heraus, dass die eben beschriebene Erkrankung sich in unmittelbarem Anschluss an eine ganz ähnliche Affection der Haut des Oberschenkels entwickelt hatte, als deren Ursache man einen kaum verheilten Scharfker ansehen musste, welchen Patient vor einiger Zeit acquirirt zu haben angab. Sonstige Erscheinungen waren bislang nicht bei ihr aufgetreten. Die Diagnose „Syphilis“ wurde natürlich für die erwähnte lupusähnliche Affection der Nase nun als bestätigt angesehen, und durch den Erfolg einer nach dieser Richtung hin geleiteten Therapie vollkommen gerechtfertigt. Nach einer mehrmaligen Darreichung von Jodkalium bildeten sich die Knötchen vollkommen zurück.

Wie man von vornherein erwarten konnte, liess die Untersuchung eines kleinen dieser Nase entnommenen Hautstückes ganz andere Verhältnisse erkennen, als sie bei dem Lupus gefunden werden. Die Cutis war ziemlich gleichmässig mit jungen lymphoiden Elementen infiltrirt, die sich hier und da in der Umgebung der grossen Talgdrüsen stärker anhäuften. Von den eigentlichen charakteristischen Lupusherden mit epitheloiden und Riesenzellen war nirgends eine Spur zu sehen.

Nicht minder häufig als die Syphilis scheint eine Geschwulstform zur Verwechselung mit Lupus Veranlassung gegeben zu haben, welche noch immer eine etwas zweifelhafte Stellung in der Onkologie einnimmt: das Adenom der Schweissdrüsen. Die Literatur der hierher gehörigen Tumoren ist, seitdem Verneuil¹⁾ zum ersten Male auf eine derartige Erkrankung aufmerksam machte, nur um wenige und obendrein nicht ganz unzweifelhafte Fälle vermehrt worden. Wenn man dagegen in den neueren casuistischen Mittheilungen über Lupus häufig genug analoge Geschwülste beschrieben findet, so liegt gewiss die Vermuthung nahe, dass sich dieselben unter der fälschlichen Diagnose „Lupus“ der Einreihung in die Klasse der Schweissdrüsenadenome entzogen haben. Und doch bieten diese Tumoren in ihrer klinischen Erscheinung so manche Verschiedenheit von dem Lupus dar.

In zweien von uns beobachteten Fällen präsentirten sich dieselben als kleine 1—1,5 Cm. im längsten Durchmesser haltende, ungefähr 5—6 Mm. über die Cutis erhabene Geschwülste, welche aus wurstförmigen und knötchenähnlichen Prominenzen zusammengesetzt waren. In dem einen Falle war die Epidermis vollkommen

1) Die Literaturangaben siehe am Schluss des Aufsatzes S. 22.

halten, in dem anderen theilweise durch frühere mechanische Einwirkungen zerstört. Der eine dieser Tumoren sass über dem medialen Gelenkwinkel einer im mittleren Lebensalter stehenden Frau, der andere in der Gegend des Unterkieferwinkels eines älteren weiblichen Individuums. Beide bestanden — dieser Punkt dürfte besonders hervorzuheben sein — schon sehr lange Zeit (in dem einen Falle über zehn Jahre), ohne jemals eine erhebliche Tendenz zu stärkerem Wachsthum oder zur Ulceration gezeigt zu haben. Der eine sollte nach einem Dornstich entstanden sein, für den anderen kein ätiologisches Moment nachzuweisen. Der Vollständigkeit halber sei noch bemerkt, dass in dem ersten Falle mehrere Male eine spontane Blutungen während einer Schwangerschaft der Patientin zur Beobachtung kamen.

Auf dem Verticalschnitt der exstirpirten Geschwulst sieht man das hellere Tumorgewebe durch eine feine Linie gegen die umgebende normale Haut abgegrenzt. Diese Grenzlinie bildet mit der überdeckenden Epidermis den Bogen eines Kreissegmentes, dessen Mitte in der durch das Unterhautbindegewebe geführten Schnittlinie gegeben ist. Makroskopisch lassen sich auf dem Durchschnittsrande, welcher Strukturverhältnisse kaum wahrnehmen. Nur an einigen Stellen sieht man aus der Tiefe baumförmig verästelte Stränge, welche nach Erhärtung in Alkohol im Gegensatze zu dem glänzend weissen Colorit des übrigen Gewebes ein mehr gelbliches Ansehen gewinnen, aus dem Unterhautbindegewebe gegen die Epidermis emporsteigen. Hier und da zeigten sich in dem einen Falle einige undeutende, durch kleine Blutextravasate bedingte Zerklüftungen.

Die Abgrenzung des Tumors gegen das umgebende Gewebe lässt sich nun durch die mikroskopische Untersuchung feiner Verticalschnitte genauer feststellen.

An diesen Präparaten kann man sofort constatiren, dass der Tumor die Cutis in die Höhe gehoben und nach der Oberfläche zu fast ganz verdrängt hat. Fast überall reicht die Masse der Geschwulst an das Rete Malpighii heran und ist nur durch eine ganz mit Rundzellen infiltrierte Cutisschicht von geringer Mächtigkeit von derselben getrennt. An einigen wenigen Stellen fehlt sogar die Epidermis völlig und der Tumor liegt hier, von einem spärlichen Granulationsgewebe bedeckt, zu Tage.

Gleich einer Kapsel trennt eine feine Schicht zellenreichen Bindegewebes die Geschwulstmasse von der seitlich gelegenen völlig normalen Cutis. Dann und wann sieht man, dass lange von den Zellen des Rete ihren Ursprung nehmende Epithelsprossen jene feine Binde-

gewebsschicht auf eine Strecke hin begleiten und so das Bild einer Scheidewand noch vervollständigen helfen. Ein unbestimmter Uebergang der Elemente des Tumors in das seitliche Gewebe, wie wir ihn so häufig bei Angiomen antreffen, ist nirgends zu erkennen.

In den tieferen Schichten der Cutis lässt sich die Geschwulst bis zu der Gegend verfolgen, in welcher unter normalen Verhältnissen die Schweissdrüsen vorgefunden werden. Die Grenze gegen das subcutane Gewebe ist jedoch nicht mit derselben Bestimmtheit ausgesprochen, wie gegen die zu den Seiten der Neubildung gelegene normale Haut. Die Elemente des Tumors ragen vielmehr in verschiedener Höhe in das Unterhautbindegewebe hinein; doch lässt sich im Allgemeinen die Grenze durch eine mehr oder weniger wellenförmig gebogene, in der Gegend des eigentlichen Sitzes der Schweissdrüsen verlaufende Linie bezeichnen. Es soll gleich hier angemerkt werden, dass von manchen der alsbald näher zu beschreibenden Acinis der Neubildung zackenförmige Fortsätze in das tiefer liegende Gewebe hineinragen, und sich hier in Zellenhaufen verlieren, welche ihrer Lage und Form nach den Umrissen von Schweissdrüsen entsprechen.

Das Gewebe der in die Cutis eingelagerten Geschwulstmasse besteht aus verschiedenartig geformten, keulenförmigen, Drüsengängen- und Drüsenläppchen ähnlichen Gebilden.

Mannigfache Verschiedenheiten in der Grösse darbietend, gleichen diese Elemente der Neubildung bald den Acinis der Leber, bald mehr flaschenartigen Bildungen, ähnlich etwa bedeutend vergrösserten Talgdrüsen. Häufig sieht man ferner lange vielfach gewundene, nach allen Seiten hin sprossentreibende Zellenzüge das Gewebe der Cutis durchsetzen.

Ziemlich derbe zellenreiche Bindegewebszüge, welche wohl als von der Neubildung nicht ergriffene Theile der Cutis anzusprechen sein dürften, bilden die Scheidewand zwischen den einzelnen Läppchen und Kölbchen des Tumorgewebes. Dieselben dienen zugleich als Träger für die Gefässe, welche nur in verhältnissmässig geringer Anzahl in den Durchschnitten vorgefunden werden. In diesem Bindegewebe trifft man ferner hier und da auf bedeutend erweiterte Schweissdrüsenausführungsgänge, auf deren genaueres Verhalten wir später zurückkommen müssen.

Von den übrigen unter normalen Verhältnissen in der Haut gelegenen Bildungen, von Haaren, Talgdrüsen, sowie von unveränderten Schweissdrüsen ist in der ganzen Ausdehnung der Geschwulst keine Spur zu finden.

Bei einer etwas aufmerksameren Betrachtung der einzelnen Acini ist es sofort auf, dass nur die kleineren derselben ein solides gleichmässiges Aussehen zeigen. Die grösseren erscheinen durchweg als durchlöcherichte, gleichsam gitterförmige Bildungen. Meist lassen diese grösseren Formen in der Mitte eine ziemlich beträchtliche, bald mehr rundliche, bald ovale Oeffnung, in der hier und da undeutliche Detritusmassen gelagert sind, erkennen.

Betrachten wir zuerst die soliden Läppchen etwas näher, so ergibt sich leicht, dass dieselben aus Zellen von epithelialem Charakter zusammengesetzt sind, deren Grösse ungefähr der normaler Drüsenepithelien entspricht. Eine einfache Reihe mehr cylinderförmiger Zellen, welche gegen die Peripherie des Läppchens senkrecht gestellt sind, bilden die Randzone eines jeden Acinus. Der übrige Raum des Gebildes wird durch längsovale ebenfalls kernhaltige Zellen ausgefüllt, welche meist ohne bestimmte Ordnung nebeneinander gelagert sind. Einigemal allerdings sah ich auch in der Mitte des Läppchens oder etwas excentrisch eine kreisförmig angeordnete Zellenreihe eine rundliche Oeffnung umgrenzen. Dann und wann biegen die cylinderförmigen Zellen der Randzone ein, und bilden einen gegen das Centrum des Acinus verlaufenden Gang, den man vielleicht als die Andeutung eines Ausführungsganges auffassen dürfte.

Diese eben beschriebenen solid gebauten Läppchen zeigen nun mannigfache Uebergänge zu den grösseren gitterförmig durchlöcherichten Acinis. Für eine ganze Anzahl dieser Gebilde kann man sogar schon eine Reihe successiver Durchschnitte mit Sicherheit constatiren, dass sie direct in einander übergehen. Demgemäss erscheint der Grundplan und die constituirenden Elemente beider Formen als gleichen.

Wie bei den soliden Acinis finden wir auch hier eine durch mehr cylinderförmige zu der Peripherie senkrecht stehende Zellen gebildete Randzone. Das eigentliche Parenchym des Läppchens wird von mehr oder weniger grossen, theils rundlichen, theils ovalen Zellen durchsetzt, welche durch breite aus den oben beschriebenen Zellen zusammengesetzte Balken von einander geschieden werden. In der Mitte oder etwas excentrisch findet sich häufig jene grössere Oeffnung, deren wir schon vorhin Erwähnung gethan haben.

Die meisten Lücken sind mit einer feinkörnigen Masse angefüllt, in welcher sich hier und da noch freie Kerne und Bruchstücke von Zellen erkennen lassen. Einige Lücken erscheinen völlig leer, andere enthalten eine homogene Substanz, welche sowohl in Form

von Fäden als auch in grösseren Klumpen geronnen ist, und dann und wann ebenfalls Zellenreste und feinkörnige Massen in sich einschliesst.

Die zunächst an die Lücken angrenzenden Zellen erscheinen öfters vergrössert und ragen blasig aufgetrieben in das Lumen hinein. Das Ganze macht entschieden den Eindruck, als ob die Zellen unter der Einwirkung irgend eines chemischen Agens ihre Form allmählich verändert und sich schliesslich in jene undeutlich körnige Masse umgewandelt hätten, welche das Maschenwerk der Läppchen erfüllt.

Jene flaschenförmigen in das Gewebe eingelagerten Zellenglomerate, deren wir oben bei der allgemeinen Charakteristik der einzelnen Theile der Neubildung gedachten, bieten im Allgemeinen in ihrer Zusammensetzung ein gleiches Verhalten, wie die vorher beschriebenen, Drüsenläppchen ähnlichen, soliden Gebilde. Wir werden weiter unten sehen, dass dieselben als Auswüchse von Drüsengängen aufzufassen sind.

Einfache Drüsengänge werden nun ebenfalls, an einzelnen Stellen des Tumors sogar in überwiegender Anzahl, auf den Durchschnitten angetroffen. Dieselben sind unregelmässig zwischen den läppchen- und flaschenförmigen Bildungen zerstreut, relativ häufig liegen sie in den tieferen Schichten, wo sie sich baumförmig nach allen Richtungen hin verästeln. Nicht eben selten kann man solche Gänge bis zu den oben erwähnten in der Gegend der Schweissdrüsen gelegenen Zellenhaufen verfolgen, aus welchen sie ihren Ursprung nehmen.

Ihre Zusammensetzung ist im Ganzen äusserst einfach. Der Kanal besteht aus einer sehr feinen structurlosen Membran, auf welcher eine einfache Reihe jener nun schon häufiger geschilderten Zellen als bekleidendes Epithelium aufsitzt. Hin und wieder ist kein Lumen nachweisbar; wir treffen dann auf einen soliden Zellstrang, der meist irgendwo in dem Gewebe blind endigt.

Es ist leicht ersichtlich, dass die Entstehung aller der in den vorhergehenden Blättern geschilderten Geschwulstelemente mit den normalen in der Haut gelegenen drüsigen Gebilden in Zusammenhang gebracht werden muss. Schon die Regelmässigkeit ihrer histologischen Zusammensetzung, der evidente Zusammenhang der einzelnen durchgenommenen Formen untereinander, der leicht zu führende Nachweis von wirklichen Drüsen und Drüsenausführungsgängen müssen uns auf diese Vermuthung hinleiten.

Dieselbe wird noch mehr dadurch bekräftigt, dass wir in der

azzen Ausdehnung und an den Grenzen des Tumors gewisse drüsige Apparate vermissen oder doch so verändert vorfinden, dass nur eine genaue vergleichende Untersuchung sie als Reste normaler Bildungen erkennen lässt. Diese Apparate sind die Schweissdrüsen.

Es ist nicht schwierig, in vielen Schnitten theils einen directen Übergang einzelner Formen der Neubildung in die erkrankten Drüsen zu constatiren, theils den Aufbau des ganzen Tumors aus diesen Veränderungen, welche diese Apparate erlitten haben, abzuzeichnen.

Wenn wir die pathologischen Processe, welche sich an den erwähnten drüsigen Gebilden abspielen, näher betrachten, so finden wir bald, dass dieselben sich nicht unpassend in drei Abtheilungen ordnen lassen. Wir unterscheiden:

I. Ein Stadium der Infiltration.

II. Ein Stadium der Proliferation.

III. Ein Stadium der Cystenbildung.

Durch die Infiltration wird der normale Drüsenknäuel zu einem im Eingange erwähnten grossen Zellenhaufen umgewandelt; von hier ausgehende Proliferation schafft die die Cutis durchdringenden Zellengänge — welche ihrerseits zu den soliden Drüsenknäulen auswachsen; durch Verlegung der Ausführungsgänge endlich kommt in den letzteren ein Zerfall, eine Cystenbildung zu Stande, welche sich uns unter dem Bilde der gitterförmig durchlöchernten Acini präsentiert.

Den Beginn der ganzen Affection, welche wir vielleicht als einen chronisch entzündlichen mit reichlicher Neubildung einhergehenden Process — als eine chronische proliferirende Adenitis sudoripara — aufzufassen haben, charakterisirt eine zellige Infiltration der Schweissdrüsen. Dieselbe tritt gewöhnlich wie die oben für den Lupus beschriebene analoge Veränderung zuerst am Rande der Drüse auf und verwandelt einen kleinen Abschnitt derselben in einen Haufen dichtgedrängter Zellen, ohne dass an den noch freien Drüsenquerschnitten irgend eine erhebliche Veränderung bemerklich wäre. Mit der Invasion der Rundzellen beginnen die Querschnitte des Drüsenkanals undeutlich zu werden und verschwinden allmählich fast ganz unter der immer mehr zunehmenden Masse der lymphoiden Elemente.

Es ist mir nicht möglich gewesen mit Sicherheit zu entscheiden, ob die in den Drüsen auftretenden Zellen Derivate der normalen Drüsenepithelien sind oder ob sie dem umgebenden Bindegewebe entstammen. Namentlich für die frühesten Gebilde möchte ich mich

der letzten Ansicht zuneigen, da ich einmal die Gefässe der Drüsen und des umgebenden Bindegewebes sehr gross und prall gefüllt gefunden habe und weil mir andererseits mehreremale Zellansammlungen um die Gefässe herum begegnet sind. Diese Zustände möchten doch wohl auf eine entzündliche Hyperämie des Gewebes in der Umgebung der Drüsen hindeuten.

Der Process schreitet nun, wie es scheint, rasch weiter fort. In der Nähe der Drüsen, welche uns die Anfangsstadien der Zelleninfiltration zeigen, trifft man bald auf grosse Haufen von Rundzellen, welche das gewöhnliche Volumen eines Schweissdrüsenquerschnittes wohl um das Doppelte, ja um das Drei- und Vierfache übertreffen. Bei genauerer Untersuchung mit stärkeren Vergrösserungen erkennt man in den meisten dieser Haufen noch immer einen oder den anderen Querschnitt des ursprünglichen Drüsenknäuels. Die grösste Anzahl der Drüsenquerschnitte jedoch ist unsichtbar geworden, und es erscheint nicht unpassend anzunehmen, dass die Epithelien des Drüsenkanals sich nach einmal erfolgter Infiltration an dem Prozesse betheiligen und durch Theilung und Proliferation jene grossen Haufen von Rundzellen formiren helfen. Benachbarte Haufen fliessen manchmal zusammen, und so sind oft relativ grosse Strecken des Unterhautzellgewebes dicht mit lymphoiden Elementen infiltrirt.

Hin und wieder sieht man in diesen Zellenhaufen grosse Fett-schollen liegen, welchen wir später bei der Betrachtung der Ausführungsgänge der Drüsen wieder begegnen werden.

Bis hierher war die geschilderte Affection der Schweissdrüsen von der im Lupus vorkommenden interstitiellen Wucherung nur graduell verschieden. Während aber dort die Zelleninfiltration auf den bestimmten von dem Drüsenknäuel eingenommenen Bezirk beschränkt blieb und so zu der Bildung von Lupusknötchen führte, welche den für diese charakteristischen weiteren Veränderungen unterlagen, geht hier die Wucherung weit über die Grenzen hinaus, und erzeugt den Mutterboden für eine dem früheren normalen Gewebe in manchen Beziehungen ähnliche, aber excessiv weiter schreitende Neubildung.

Die ferneren Schicksale der zu den beschriebenen Zellenhaufen umgewandelten Drüsen lassen sich zwar schwerer und mit geringerer Sicherheit verfolgen, aber nichtsdestoweniger glauben wir die eben aufgestellte Behauptung wenigstens wahrscheinlich machen zu können, dass diese Zellenhaufen als der Ausgangspunkt für die Bildung der früher geschilderten Elemente zu betrachten sind.

Wenn wir das Verhältniss der früher erwähnten an die Schweissdrüsenregion grenzenden Zellengänge zu den infiltrirten Drüsen an

einer Reihe successiver Durchschnitte näher betrachten, so finden wir bald, dass die fraglichen Gänge an die Zellenhaufen herantreten, und es ist nicht schwer zu constatiren, dass es einen Punkt gibt, in dem eine grössere oder kleinere Anzahl derselben direct aus den Rundzellenhaufen ihren Ursprung nimmt (s. Taf. Fig. 7).

Am Rande des Haufens nämlich ordnen sich die lymphoiden Elemente in Züge, welche (während die Zellen zugleich einen mehr epithelialen Charakter annehmen) alsbald unter zahlreichen und mannigfachen Verästelungen gegen die Oberfläche ansteigen. Eine Anzahl dieser anfangs breiten, soliden Zellengänge gelangt unter vielfachen Theilungen immer geringere Dimensionen annehmend zur Epidermis. Diese feinen, den ursprünglichen Drüsenkanälen sehr ähnlichen Gebilde erhalten auf eine nicht näher bekannte Weise ein Lumen.

Viele der soliden Zellengänge gehen andere Veränderungen ein. An geeigneten Präparaten sieht man, wie dieselben mit einander verschmelzen, sich unter einander verbinden und unter einer immer stärker werdenden Proliferation grössere solide Sprossen treiben. Die am Rande dieser Bildungen gelegenen Zellen nehmen allmählich eine gegen die Peripherie senkrechte Stellung ein — und so kommen auf diese Weise die flaschenförmigen Bildungen und die soliden Läppchen der Geschwulst zu Stande (s. Taf. Fig. 8).

Die ferneren Metamorphosen des neugebildeten Gewebes sind regressiver Natur und leicht zu verstehen.

Schon früh treffen wir, wie bereits oben bemerkt wurde, auf stark erweiterte und mit fettigen Massen verstopfte Ausführungsgänge. Die sonst wenig mächtige Wandung derselben ist stark verdickt und mit lymphoiden Elementen infiltrirt, auf dem Querschnitt sind nur noch Spuren des früheren Epithels zu bemerken. Nicht selten sieht man auch eine dichte Zellinfiltration um die Gänge herum. Sowie derartige Hindernisse in und an den Ausführungsgängen aufgetreten sind, zerfallen die Zellen an vielen Orten, nachdem sie, wie schon erwähnt, gross und blasig geworden sind. Unter dem fortwährenden Druck, welchen ein verhaltenes Secret, das — wie aus dem anatomischen Befunde doch wohl mit einiger Sicherheit resultirt — auch von den neugebildeten Drüsenzellen noch abgesondert werden muss, auf die Acini ausübt, kommen immer mehr kleine cystische Hohlräume innerhalb derselben zu Stande, und so entstehen jene gitterförmig durchlöcherten Läppchen, das letzte der erwähnten den Tumor constituirenden Gebilde, welches noch einer entwicklungsgeschichtlichen Erklärung bedurfte.

Möge es uns zum Schlusse gestattet sein, dieser Betrachtung noch einige wenige Worte hinzuzufügen, welche die Literatur der von den Schweissdrüsen ausgehenden Geschwülste betreffen.

Die Lehre von den Schweissdrüsenadenomen ist durch Virchow's, den von Verneuil und Lotzbeck veröffentlichten Fällen gegenüber nur zu berechtigten, Zweifel in der neueren Zeit etwas in Misseredit gekommen. Der Ansicht von Virchow, dass jenen Berichten wohl eine Verwechselung mit Teleangiektasien zu Grunde gelegen habe, schliesst sich auch König an, welcher ausserdem darauf aufmerksam macht, dass ein Theil jener Neubildungen vielleicht als flache Hautcarcinome aufzufassen sei. Andere Autoren, wie Wagner, Klebs, Billroth sprechen sich für die Existenz der Schweissdrüsenadenome aus; Letzterer erklärt übrigens ausdrücklich, dass er selbst nie einen derartigen Fall beobachtet habe.

Bei einer genauen Durchsicht der Arbeiten von Verneuil, Lotzbeck und der theilweise auch hierher gehörigen von Remak wird man wohl Virchow beistimmen müssen, welcher schon in seinem Referate über Verneuil's Abhandlung in dem Canstatt'schen Jahresbericht erklärte, dass er in den beschriebenen Fällen eine genaue Beweisführung vermisse. Es erscheint in der That ziemlich plausibel, dass man es in der einen Reihe von Fällen mit Angiomen, in der anderen mit flachen Epithelcarcinomen zu thun gehabt hat. Den Fall von Lotzbeck bezeichnet Virchow geradezu als *Naevus vasculosus*.

Etwas weniger skeptisch möchte ich mich dem von Herrn Geheimrath Baum exstirpirten Tumor gegenüber verhalten, welchen A. Förster in seinem Atlas der pathologischen Histologie beschrieben hat.

So viel man aus der leider nicht sehr ausführlichen Schilderung sowie aus den allerdings etwas unklaren Abbildungen entnehmen kann, scheint hier eine den oben beschriebenen Erkrankungsformen wenigstens theilweise analoge Geschwulst vorgelegen zu haben. Dieselbe ging aus Wucherungen der normalen Schweissdrüsenkanäle hervor und bestand aus einer grossen Anzahl einfacher oder gelappeter Körper. Die feineren Verhältnisse derselben gestalteten sich im Allgemeinen unseren soliden Lappchen analog. Aehnlich wie wir, konnte Förster ferner in dem Drüsengange, dessen Wand nur verhornte Zellen zeigte, concentrische Zellenlagen mit dunklen Fettklumpen in der Mitte beobachten. Am Rande der Neubildung liessen sich einzelne in voller Entartung begriffene Schweissdrüsen nachweisen. Es wird noch erwähnt, dass die Fortsetzungen der

ellen der Schleimschicht, alle Haar- und Talgdrüsengänge in der Umgebung der Geschwulst viel zellenreicher als gewöhnlich waren, und dass auch von ihnen seitliche Ausbuchtungen abgingen, welche genau dieselbe typische Anordnung der Zellen, wie die Ausbuchtungen der Schweissdrüsen selbst hatten.

Wenn man jedoch die weiteren Ausführungen über das Verhältniss der Drüsengeschwulst zu dem Epithelialkrebs, welche Förster in seiner Beschreibung seines Falles anschliesst, mit der gleichzeitig herangezogenen Affection der Haarbälge und Talgdrüsen zusammenhält, so geräth man wieder in Zweifel, ob nicht die beschriebene Drüsengeschwulst der Haut doch nur eine auf dem Boden eines Carcinoms zu Stande gekommene Hypertrophie und Proliferation der Hautdrüsen darstelle.

In der neuesten Zeit ist A. Lücke auf Grund mehrerer Beobachtungen in seiner bekannten Geschwulstlehre als Vertheidiger der Existenz des Schweissdrüsenadenoms aufgetreten. Die Schilderung dieser Tumoren gebe ich mit seinen eigenen Worten wieder:

Bei dem *Adenoma sudoriparum* geht die Neubildung von den tieferen Theilen der Drüse aus, und es bildet sich hier eine reichliche Entwicklung von Drüsenschläuchen; es handelt sich also um eine einfache Hyperplasie, welche in Geschwulstform auftritt. Die Drüsenschläuche erscheinen zugleich länger, gewundener, sie haben blinddarmförmige Ausbuchtungen und sind in ihrem Dickendurchmesser vergrössert, entweder allseitig oder nach einer Seite hin erweitert; eine Abkapselung gegen das Nachbargewebe kann stattfinden.

In klinischer Beziehung hebt Lücke den langsamen Verlauf der Geschwülste besonders hervor.

Während es sich also in diesen Fällen bloss um Schweissdrüsen-Hyperplasien handelt, haben wir in dem Falle von Thierfelder es mit einem Tumor zu thun, der in mancher Beziehung, namentlich was das reichliche Vorkommen der cystischen Bildungen betrifft, den eben beschriebenen Geschwülsten an die Seite zu stellen ist. Aus dem abnormen Fundorte — Thierfelder beschreibt diesen Tumor als einen in das Stirnbein verirrten und von dort sich weiter entwickelnden Drüsenkeim — lassen sich sowohl die einzelnen Differenzen wie die Malignität dieser Geschwulst ganz gut erklären.

Es bliebe nun noch die im Laufe dieser Arbeit schon mehrfach citirte Ansicht von Rindfleisch zu erwähnen übrig, welcher bekanntlich gerade den Lupus als Adenom der Talg- und Schweiss-

drüsen angesprochen hat. Der Schilderung, welche Rindfleisch von dem lupösen Prozesse entwirft, haben jedenfalls Beobachtungen analoger Talg- und Schweissdrüsenerkrankungen zu Grunde gelegen. Wie sehr und in welchen Punkten aber dieselben mit den in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Tumoren übereinstimmen, in welcher Hinsicht sie von denselben differiren, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu erörtern. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass Rindfleisch offenbar (man vergleiche die von ihm gegebene Abbildung) den Veränderungen der Talgdrüsen eine weit grössere Bedeutung als den Affectionen der Schweissdrüsen für den Lupus zuzusprechen scheint.

Ich habe im Folgenden die Literatur der Schweissdrüsenadenome, soweit mir dieselbe bekannt geworden, übersichtlich zusammengestellt:

Remak, Deutsche Klinik 1854. 16. — Verneuil, Gaz. med. de Paris 1853. No. 53. p. 831. — Ders., Arch. générales 1854. Oct. p. 447. — Ders., Bulletin de la société. anatom. Fevr. 1857. Hierzu vergl. man Canstatt's Jahresb. 1854. II. S. 56 und 1857. IV. S. 284. — Förster, Atlas der mikrosk. pathol. Anat. Taf. XXIII. 1—4. — Ders., Handbuch der path. Anat. I. S. 357 und II. S. 1087. — Lotzbeck, Virchow's Archiv. XVI. 160. — Virchow, Geschwülste. III. S. 411. — A. Lücke, Geschwulstlehre. S. 276. — F. König, Lehrb. der Chirurgie. I. 167. — Klebs, Handbuch der pathol. Anat. I. 36. 105. — Billroth, Allgem. Chirurg. 1872. S. 700. — Thierfelder, Archiv von Roser u. Wunderlich. XI. S. 401. — Uhle u. Wagner, Allgem. Pathol. 1874. S. 600. — Rindfleisch, Pathol. Gewebelehre. 1873. S. 291 ff.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten
Lehrer, dem

Herrn Professor F. König

für die vielseitige gütige Unterstützung, welche er mir bei der An-
fertigung dieser Arbeit zu Theil werden liess, an dieser Stelle
meinen wärmsten Dank abzustatten.

